

Bruterfolgsmonitoring im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 2018

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*



Foto: Wernicke

Hermann Hötter*, Michael Beverungen, Brigitte Kliner-Hötter

[*Hermann.Hoetker@NABU.de](mailto:Hermann.Hoetker@NABU.de)
Michael-Otto-Institut im NABU
Goosstroot 1
24861 Bergenhusen

Dezember 2018

Studie im Auftrag des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein

Zusammenfassung

Bruterfolgsmonitoring im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 2018 - Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Hermann Hötker, Michael Beverungen, Brigitte Kliner-Hötker

Das 2009 begonnene Monitoring des Bruterfolgs von Säbelschnäblern wurde 2018 mit gleicher Methode im Fahretofter Westerkoog mit Vorland, im Hauke-Haien-Koog, im Beltringharder Koog mit nordwestlichem Vorland und im Vorland des Kaiser-Wilhelm-Kooges fortgeführt. Die Gebietsauswahl war vor allem danach erfolgt, ob das Gelände es zuließ, Küken ausreichend gut zu beobachten und somit den Bruterfolg festzustellen. Im Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland fanden regelmäßige Kontrollen der Nester und Zählungen der Küken statt, in den drei übrigen Gebieten wurden lediglich die Küken regelmäßig gezählt und der Schlupferfolg grob abgeschätzt.

Die Erfassungen verliefen plangemäß. Das Brutgeschehen auf dem Salzwiesenstandort vor dem Kaiser-Wilhelm-Koog begann wie in den Vorjahren spät (Mitte Mai). Dort war der Schlupferfolg sehr hoch, es überlebten aber kaum Jungvögel bis zum Flüggewerden. Im Beltringharder Koog waren wie im Vorjahr sowohl Schlupf- als auch Bruterfolg relativ hoch. Im Bereich Hauke-Haien-Koog / Fahretofter Westerkoog gab es zwar einen beträchtlichen Schlupferfolg, es kamen jedoch im Hauke-Haien-Koog – auch bedingt durch eine künstliche Wasserstandssenkung im Frühjahr – fast alle der wohl mehr als 500 geschlüpften Küken ums Leben. Als wesentliche weitere Gründe für Verluste konnten hohe Prädationsraten der Nester und Verluste durch Schafe (im Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland) festgestellt werden.

	Brutbestand	Schlupferfolg	flügge Jungvögel	Bruterfolg (flügge Jungvögel pro Paar)
Fahretofter Westerkoog	81	niedrig	13	0,04
Hauke-Haien-Koog (Nordbecken)	241	mittel		
Beltringharder Koog	486	hoch	376	0,77
Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland	184	73%	2	0,01

Übersicht der Bestände, des Schlupf- und des Bruterfolgs von Säbelschnäblern in den Untersuchungsgebieten 2018.

1. Einleitung

Das Monitoring des Reproduktionserfolgs von Vogelarten kann wertvolle Hinweise auf die Ursachen von Bestandsveränderungen liefern. Zurückgehende Reproduktionsraten können schneller als sinkende Bestände auf gravierende Probleme der betroffenen Vogelarten hinweisen. Dies gilt besonders für die vergleichsweise langlebigen Küstenvögel, bei denen sich gegebenenfalls ein dauerhaft niedriger Bruterfolg erst nach vielen Jahren auf die Bestandsgröße auswirkt. Aus diesem Grunde ist die Aufnahme des Parameters „Bruterfolg“ in das trilaterale Monitoringpaket für das Wattenmeer ein wichtiger Schritt für den vorausschauenden Schutz dieses Lebensraums.

Für den Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta* ist das Wattenmeer das bedeutendste Brutgebiet auf dem ostatlantischen Zugweg. Ähnliches gilt auch für die europäische Ebene: Etwa ein Sechstel der 58.400-74.300 europäischen Brutpaare befindet sich im Wattenmeer (Bird Life International, 2015; Koffijberg et al., 2015). Das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer beherbergt gut 4.000 Brutpaare, die überwiegend auf den Festlandsalzwiesen brüten. In den sogenannten „Naturschutzkögen“ befinden sich ebenfalls bedeutsame Populationsanteile, während die Art auf den Inseln deutlich seltener anzutreffen ist (Hötker et al., 2005). Nach dem Austernfischer *Haematopus ostralegus* ist der Säbelschnäbler die Vogelart, für die Schleswig-Holstein die größte globale Verantwortung trägt. In Schleswig-Holstein brüten etwa 3,6 % aller Säbelschnäbler weltweit (Cimiotti & Hötker, im Druck). Keine anderen Vogelarten kommen im Land mit höheren globalen Bestandsanteilen vor.

Säbelschnäbler brüten in Kolonien und führen ihre Küken kurz nach dem Schlüpfen in Küken-Aufzuchtgebiete, das heißt vor allem in die *Spartina*-Zonen der Vorländer beziehungsweise in breite Priele in den Salzwiesen. Auch auf binnenländischen Schlamm- und Uferflächen können Säbelschnäblerküken aufwachsen. Die Koloniestandorte und Kükenaufzuchtgebiete sind in fast allen Fällen räumlich voneinander getrennt – meist nur wenige Hundert Meter, im Extremfall aber bis zu mehreren Kilometern (Bie, 1979; Glutz von Blotzheim et al., 1975; Hötker & Kölsch, 1993; Lengyel, 2006). Die Trennung von Kolonie- und Kükenstandorten muss bei der Auswahl der Probegebiete und Methoden berücksichtigt werden.

Schlupf- und Bruterfolg von Säbelschnäblern waren bereits Gegenstand zahlreicher Publikationen (Bie & Zijlstra, 1985; Girard & Yésou, 1989; Goutner, 1985). Für Brutgebiete in Nordfriesland stellten Hötker & Segebade (2000) fest, dass der Schlupferfolg vor allem durch Bodenprädatoren und Überflutungen beeinflusst wurde, während die Überlebenswahrscheinlichkeit der Küken vor allem mit dem Wetter in Verbindung stand. Die Eignung der Parameter

Schlupf- und Bruterfolg des Säbelschnäblers für ein dauerhaftes Monitoring im Wattenmeer waren in Voruntersuchungen bereits grundsätzlich positiv bewertet worden (Thyen et al., 1998). Im Jahr 2009 erfolgte ein erster Monitoring-Durchgang und es wurden die für die Beurteilung der Ergebnisse relevanten Daten aus dem Wattenmeer zusammengetragen (Hötker et al. 2009). In dem hier vorliegenden Bericht sollen die Ergebnisse der zehnten Feldsaison 2018 vorgestellt werden.

2. Probeflächen 2018

Vor dem Beginn der Feldarbeit im Jahr 2009 war eine erste Auswahl von Probeflächen erfolgt. Zwei Gebiete, der Fahretofter Westerkoog und der Beltringharder Koog, standen wegen der dort ohnehin seit mehreren Jahren durchgeführten Arbeiten zur Brutbiologie des Säbelschnäblers bereits von vornherein fest (Abb. 1). Beide Gebiete unterschieden sich durch die Kükenhabitate. Während die Küken im Fahretofter Westerkoog kurz nach dem Schlüpfen ins Vorland geführt wurden, wuchsen in der Vergangenheit die im Beltringharder Koog erbrüteten Küken überwiegend im eingedeichten Bereich auf (Hötker & Segebade, 2000). Allerdings gewann in den vergangenen Jahren auch das rasch anwachsende Vorland nordwestlich des Kooges an Bedeutung als Kükenaufzuchtgebiet.




Abb.1. Lage der Untersuchungsgebiete.

Die Auswahlkriterien für die übrigen Gebiete waren

1. die Möglichkeit, Jungvögel vom Deich aus zu beobachten, ohne die Familien zu stören und dadurch zu vertreiben,
2. das Vorhandensein einer gut zugänglichen, ausreichend großen Brutkolonie (mindestens 40 Nester),
3. die Möglichkeit, in einem ausreichend ungestörten Bereich zu arbeiten, und
4. die Wahrscheinlichkeit, an gleicher Stelle auch in folgenden Jahren entsprechende Kolonien vorzufinden.

Im Bereich der nordfriesischen Küste schien das Butterloch beziehungsweise die angrenzende Brutkolonie auf der Hamburger Hallig diese Kriterien zu erfüllen. Nachdem sich dort jedoch 2009 und 2010 nur wenige Paare angesiedelt hatten und kein Bruterfolg zu verzeichnen gewesen war, wurden ab 2011 dort keine Untersuchungen mehr durchgeführt. In Dithmarschen fiel die Wahl auf die Vorländer des Kaiser-Wilhelm-Kooges wegen der relativ geringen Entfernung zwischen Deich (ungestörte Beobachtungsmöglichkeiten) und Schlickgraszone (potentielle Kükenlebensräume), der hohen Anzahl gut zugänglicher Koloniestandorte und der Konstanz der Besiedelung (Südbeck & Hälterlein, 2001).

Da sich 2014 offensichtlich einige der in den vergangenen Jahren im Fahretofter Koog brütenden Säbelschnäbler im fast unmittelbar angrenzenden Nordbecken des Hauke-Haien-Kooges angesiedelt hatten, wurde dieses ab 2014 als weiteres Untersuchungsgebiet aufgenommen.

3. Methoden

Im Kaiser-Wilhelm-Koog wurden, nachdem sich die Kolonien offensichtlich etabliert hatten (viele Säbelschnäbler saßen dauerhaft auf ihren Nestern), Koloniestandorte aufgesucht und die Nester mit nummerierten Plastikschildern markiert. In regelmäßigen Abständen von durchschnittlich etwa einer Woche erfolgten Nestkontrollen, die dazu dienten, das Schicksal einzelner Gelege zu bestimmen.

Bei der Erstbegehung am 17.5.2018 wurden sämtliche Nester der Kolonie markiert und ihre Lage in einer groben Skizze vermerkt. Der Nestinhalt wurde notiert: Zahl der Eier, gegebenenfalls schlüpfende oder geschlüpfte Küken, zerbrochene Eier. Weitere Nestkontrollen fanden am 24.5., 30.5., 4.6., 13.6., 19.6. und 27.6. statt. Jeweils wurden wiederum alle neuen Nester gesucht, markiert und deren Nestinhalte notiert. Leere Nester wurden auf die Existenz von kleinen Eischalensplittern, die auf den Schlupf der Jungvögel hindeuten (Mabee, 1997), untersucht.

Die Gelege wurden als erfolgreich angesehen, wenn mindestens ein schlüpfendes oder ein frisch geschlüpfte Küken in der Nestmulde gefunden wurden, wenn kleine Eischalensplitter in der Nestmulde auf den Schlupf hindeuteten und wenn die Eier nach dem Zeitpunkt des zu erwartenden Schlupftermins verschwunden waren und keine Zeichen auf Zerstörung oder Raub vorhanden waren. Das Gelege wurde als nicht erfolgreich angesehen, wenn Hinweise auf die Zerstörung des Nestes oder den Raub der Eier vorlagen oder wenn das Nest verlassen war. Nester wurden als ausgeraubt betrachtet, wenn die Zerstörung der Nestmulde, Spuren der Prädatoren, zerstörte Eier, große Eischalen oder Dotterreste im Nest auf den Raub der Eier hindeuteten oder wenn die Eier vor Ablauf der regulären Bebrütungszeit von 23 Tagen verschwunden waren.

Der Schlupferfolg wurde mit der Methode von Mayfield berechnet (Mayfield, 1961, 1975):

$$\text{Schlupferfolg} = (1 - T_V / T_E)^{27}$$

T_V : Anzahl der Tage mit Verlusten; T_E : Nesttage (Summe der Tage, an denen alle Nester unter Kontrolle standen). Der Exponent 27 wurde gewählt, weil davon ausgegangen werden kann, dass zwischen der Eiablage und dem Schlupf eines Säbelschnäblergeleges durchschnittlich 27 Tage vergehen (Hötker, 1998).

Für die Schlupferfolgsberechnungen konnten diejenigen Gelege nicht berücksichtigt werden, die am Fundtermin bereits zerstört oder verlassen waren. Letzteres galt besonders für Gelege aus ein oder zwei Eiern, die offensichtlich schon am Fundtag nicht mehr bebrütet wurden. Die Zahl der für die Schlupferfolgsberechnungen verwendeten Nester ist aus diesem Grunde niedriger als die Zahl der gefundenen Nester.

Im Beltringharder Koog, im Hauke-Haien-Koog und im Fahretofter Westerkoog wurden keine regelmäßigen Nestkontrollen durchgeführt, da hier die Kolonien zum Teil nur schwer zu erreichen waren und ein regelmäßiges Betreten der Kolonien zudem zahlreiche andere Brutvogelarten erheblich gestört hätten. Stattdessen wurden lediglich die Anzahlen vorhandener Nester entweder durch einmalige Begehungen der Koloniestandorte oder durch Kontrollen aus der Distanz ermittelt. Bei letztgenannter Methode wurde die Anzahl brütender Säbelschnäbler mehrfach während der Brutzeit von einem entfernten Ort aus, meistens dem Deich, kartiert. Die maximale Anzahl gleichzeitig brütender Säbelschnäbler wurde als Bestand angenommen. Die Zahl der geschlüpften Küken wurde durch Zählungen ebenfalls aus der Entfernung an und kurz nach den vermuteten Schlupftagen durchgeführt. Die so ermittelten Zahlen geschlüpfter Küken dürften die tatsächlichen Schlupfzahlen erheblich unterschätzen. Sie können aber einen groben Eindruck von der Höhe des Schlupferfolgs vermitteln.

Um den Bruterfolg zu ermitteln, wurden in regelmäßigen Abständen Zählungen der Säbelschnäblerküken in den Kükenaufzuchtgebieten der untersuchten Kolonien durchgeführt. Küken, deren Alter als mindestens 25 Tage geschätzt wurden, galten als „fast flügge“ und wurden gewertet. Im Fahretofter Koog sowie im Hauke-Haien-Koog wurden die Küken in den Kögen selbst und vor allem im Watt beziehungsweise im Vorland westlich und nordwestlich der Köge gezählt (Osewohler Vorland). Die Abgrenzung nach Nordwesten war wegen der großen Entfernung nicht ganz eindeutig, sodass einige Küken übersehen worden sein könnten. Im Beltringharder Koog erstreckten sich die Zählungen auf das Vorland im Nordwesten des Kooges sowie auf den gesamten Bereich des Kooges mit Ausnahme der Sukzessionszone im Süden. Im Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland wurden die Küken-Zählungen auf den Schlickflächen westlich der Kolonien durchgeführt.

Die im Rahmen dieser Studie verwendeten älteren Daten wurden mit vergleichbaren Methoden gewonnen. Alle älteren Schätzungen des Schlupferfolgs beruhen auf Nestkontrollen und einer Datenauswertung nach Mayfield. Die Bruterfolgsberechnungen erfolgten durch Zählungen der fast flüggen Jungvögel. Die Paarzahlen wurden im Fall des Beltringharder Kooges den Brutvogelberichten entnommen (Klinner-Hötker & Petersen-Andresen 2018) oder durch die maximale Zahl gleichzeitig brütender Altvögel geschätzt. Die Daten entstammen Hötker & Segebade (2000), der Brutvogeldatenbank des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz oder eigenen Untersuchungen.

Tab. 1. Methoden und Bearbeiter in den Untersuchungsgebieten.

	Fahretofter Westerkoog	Hauke-Haien-Koog	Beltringharder Koog	Kaiser-Wilhelm-Koog Vorland
Brutbestand	Schätzung durch maximale Zahl brütender Altvögel	Schätzung durch maximale Zahl brütender Altvögel	Schätzung durch maximale Zahl brütender Altvögel und weitere Kartierungen	Nesterzählung
Schlupferfolg	Schätzung ohne Nestkontrolle	Schätzung ohne Nestkontrolle	Schätzung ohne Nesterkontrolle	Nestkontrolle, Mayfield
Bruterfolg	regelmäßige Zählungen der fast flüggen Küken	regelmäßige Zählungen der fast flüggen Küken	regelmäßige Zählungen der fast flüggen Küken	regelmäßige Zählungen der fast flüggen Küken
Bearbeiter	Hermann Hötker	Hermann Hötker	Brigitte Klinner-Hötker, Hermann Hötker, Dominic Cimiotti	Michael Beverungen, Christian Piening, Hermann Hötker

4. Ergebnisse

Fahretofter Westerkoog und Hauke-Haien-Koog (Nordbecken)

Der Fahretofter Westerkoog stand zu Beginn der Brutzeit 2018 so hoch unter Wasser, dass zunächst keine geeigneten Brutinseln zur Verfügung standen. Dementsprechend begann das Brutgeschäft dort erheblich später als in den vergangenen Jahren. Erst am 19.5. konnten zum ersten Mal 16 brütende Säbelschnäbler registriert werden. Am 10.6. wurde das Maximum von 81 brütenden Altvögeln erreicht. Spätere Zählungen brütender Altvögel ergaben geringere Zahlen. Im Vorland des Fahretofter Westerkooges brüteten 2018 keine Säbelschnäbler.

Im Fahretofter Westerkoog schlüpften 2018 offensichtlich relativ wenige Küken. Bedenkt man, dass zwar sehr kleine Küken übersehen worden sein dürften und dass viele Küken bereits vor dem Erreichen des 10. Lebensstags umgekommen sein könnten, kann man von einem niedrigen Schlupferfolg (<20%) ausgehen.

Im Nordbecken des Hauke-Haien-Kooges wurden bereits am 18.4.2018 erste brütende Säbelschnäbler entdeckt (etwa 50, vor allem auf der Insel mitten im Nordbecken). Der Maximalbestand gleichzeitig festgestellter brütender Säbelschnäbler betrug 241 am 11.5. auf der Insel mitten im Nordbecken. Wegen der großen Entfernung konnte nur sehr ungenau festgestellt werden, wie viele Küken geschlüpft waren. Allerdings deuteten Beobachtungen zahlreicher junger Küken am 26.5. (68 Küken im Alter unter 10 Tagen, zusätzlich neun hudernde Altvögel) auf einen mindestens mittleren Schlupferfolg (20 bis 50%) hin. Auffällig war jedoch, dass an den traditionellen Nahrungsgebieten am Westufer des Nordbeckens nur wenige Familien auftauchten. Insbesondere wurden dort keine älteren oder gar fast flüggen Küken gesichtet. Es wurde jedoch beobachtet, wie einige Familien versuchten, die Kreisstraße und den Seedeich im Westen des Hauke-Haien-Koogs zu überqueren, um ins Watt zu gelangen.

Im Jahr 2018 konnten allerdings nur wenige Jungvögel im Watt westlich des Hauke-Haien-Koogs beziehungsweise im Vorland westlich des Fahretofter Westerkooges beobachtet werden, so dass wohl nur wenige Küken die Wanderung vom Hauke-Haien-Koog in die Aufzuchtgebiete im Osewoldter Vorland überlebt haben dürften.

Im Vorland konnte nicht mehr zwischen den Jungvögeln aus dem Fahretofter Westerkoog und dem Hauke-Haien-Koog unterschieden werden. Deshalb mussten die Bruterfolge im Fahretofter Westerkoog und im Hauke-Haien-Koog zusammen betrachtet werden (Tab. 2). Insgesamt dürften in der Region nur 13 Jungvögel flügge geworden sein.

Tab. 2. Beobachtungen von Säbelschnäblerküken in verschiedenen Altersstufen im Fahretofter Westerkoog mit Vorland und im Hauke-Haien-Koog 2018. Die mit roter Schrift gekennzeichneten Jungvögel wurden für die Berechnung des Bruterfolgs gewertet.

Datum	11.5	19.5	26.5	2.6	10.6	19.6	29.6	6.7	17.7
Familien			14	6	7	5	2		
<5 Tage					2		1		
5 Tage		6	68		1		7		
10 Tage			12	4	2	11	5		
15 Tage				20	1	7	3	2	
20 Tage				3	3		2		
25 Tage					10	1			
30 Tage					1	6		3	
35 Tage						3	2		1
flügge							8	14	5

Beltringharder Koog

Im Beltringharder Koog bildeten sich im April und Mai vor allem im Norden des Gebietes mehrere kleine, mittlere und größere Kolonien. Die ersten brütenden Säbelschnäbler wurden bereits am 17.4. registriert. Der Brutbestand betrug insgesamt 486 Paare (Klinner-Hötker & Petersen-Andresen 2018). Im Vorland nordwestlich des Kooges brüteten 2018 keine Säbelschnäbler. Hinzu kamen auch noch acht weitere Brutpaare am südlichen Arlauufer.

Der Schlupferfolg der Säbelschnäbler im Beltringharder Koog war 2018 hoch. Besonders in der Kolonie auf einer Insel im Norden des Lüttmoorsees, die zum Schutz vor Prädatoren zuvor durch einen Graben vom Festland getrennt worden war, konnten viele frisch geschlüpfte Küken beobachtet werden.

Im Verlauf der Saison waren in vielen Teilen des Kooges heranwachsende Küken zu beobachten. Ein großer Teil von ihnen hielt sich in den im Rahmen des EU-Projekts LifeLimosa angelegten Gewässern auf. Etliche Küken wanderten in höherem Alter auch in das Sönken-Nissen-Koog-Speicherbecken an der Nordspitze und in die Vorländer nordwestlich des Kooges ein. Der Übersicht halber sind die Kükenbeobachtungen im Beltringharder Koog für die Gebiete nördlich des Transportdamms und für das nördlich Arlauspeicherbecken in getrennten Tabellen dargestellt. Für den Bereich dazwischen liegen nicht ausreichend viele synchrone Erfassungen vor. Die vorliegenden Beobachtungen erlaubten jedoch eine relativ genaue Abschätzung der Zahl flügge gewordener Küken: 40.

Tab. 3. Beobachtungen von Säbelschnäblerküken in verschiedenen Altersstufen im Beltringharder Koog 2018 (oben: Nordteil und Vorländer im Nordwesten, unten: Arlau-Speicherbecken). Die mit roter Schrift gekennzeichneten Jungvögel wurden für die Berechnung des Bruterfolgs gewertet.

Datum	10.6	16.6	3.7	11.7
Familien	36	23		
<5 Tage				
5 Tage		2		
10 Tage	22	6		
15 Tage	54	19		
20 Tage	61	48	1	
25 Tage	20	29	1	
30 Tage	5	54	3	
35 Tage		180	27	3
flügge	9	19	52	

Datum	25.6	30.6	6.7	11.7	13.7	24.7
Familien		2	1		1	
<5 Tage						
5 Tage		1				
10 Tage		7	15	2		
15 Tage		11	3	2	5	
20 Tage				5		
25 Tage			2			
30 Tage		11	3	2		1
35 Tage	8	5	8		3	1
flügge	19	13	3	17		27

Insgesamt wurden 2018 mindestens 376 Küken flügge. Dies entspricht einem Bruterfolg von 0,77 flüggen Jungvögeln/Paar.

Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland

Früher als in den vergangenen Jahren, am 17.5.2018, konnten die ersten Nester an den Koloniestandorten untersucht werden. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Kolonie deutlich vergrößert. Insgesamt umfasste sie 2018 184 Nester, von denen 175 für die Auswertung des Schlupferfolgs herangezogen werden konnten. Die Berechnung des Schlupferfolgs wurde nach Mayfield (1961) durchgeführt. 2507 Nesttagen standen 29 Nestverluste gegenüber. Daraus ergab sich eine tägliche Nestüberlebensrate von 0,988 und eine Schlupfwahrscheinlichkeit von 73 %. Die Verluste waren in 21 Fällen offensichtlich durch Prädation der Gelege verursacht worden. In acht Fällen waren Gelege durch Schafe zertreten oder zerdrückt worden.

Im Untersuchungsgebiet konnten sehr viele frisch geschlüpfte Küken beobachtet werden. Es konnten jedoch lediglich zwei nahezu flügge Küken angetroffen werden, so dass der Bruterfolg mit 0,01 Küken pro Brutpaar sehr gering war.

Tab. 4. Übersicht der Bestände, des Schlupf- und des Bruterfolgs von Säbelschnäblern in den Untersuchungsgebieten 2017.

	Brutbestand	Schlupferfolg	flügge Jungvögel	Bruterfolg (flügge Jungvögel pro Paar)
Fahretofter Westerkoog	81	niedrig	13	0,04
Hauke-Haien-Koog (Nordbecken)	241	mittel		
Beltringharder Koog	486	hoch	376	0,77
Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland	184	73%	2	0,01

5. Diskussion

Wie in den Vorjahren begann in der untersuchten Kolonie im Vorland des Kaiser-Wilhelm-Koogs das Brutgeschäft erst spät (Mitte Mai), während in den Kögen die ersten brütenden Altvögel bereits im April festgestellt werden konnten.

Bemerkenswert war, wie bereits in den Vorjahren, der sehr geringe Bruterfolg der Säbelschnäbler im Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland, der, nachdem der Schlupferfolg sehr hoch gewesen war, durch eine hohe Mortalität der Küken verursacht wurde. Über die Gründe für die hohe Kükensterblichkeit liegen keine belastbaren Daten vor. Allerdings fiel der Hauptschlupftermin der Kolonien in eine Zeit mit, verglichen mit dem restlichen Sommer 2018, ungewöhnlich niedrigen Temperaturen und hohen Außenwasserständen (Überflutung niedriger Salzwiesen). Die wesentliche Verlustursache für die Gelege war auch in diesem Jahr die Prädation. Schafe, die sich längere Zeit mitten in den Kolonien aufhielten, zerdrückten und zertraten einige Gelege. Im Beltringharder Koog führten ein hoher Schlupferfolg und günstige Habitatbedingungen für die heranwachsenden Küken wie im vergangenen Jahr zu einem hohen Bruterfolg (Abb. 2).

Die relativ geringe Zahl der Brutpaare im Fahretofter Westerkoog dürfte damit zusammenhängen, dass durch einen defekten Abfluss des Gewässers und die außergewöhnlich hohen Niederschläge im Winterhalbjahr 2017/18 der Wasserstand zu Beginn der Brutzeit wiederum sehr hoch war und somit erneut nur wenige Brutinseln zur Verfügung standen. Zudem war

durch die Anschüttung einer Brutinsel im Nordbecken des Hauke-Haien-Kooges vor einigen Jahren ein attraktiver Brutplatz entstanden, der viele Brutvögel abgezogen haben dürfte. Die genannte Brutinsel erwies sich jedoch für die Säbelschnäbler wie im Vorjahr als Falle, da es nur wenigen Küken gelang, geeignete Nahrungsgebiete am Nordwestufer des Beckens zu erreichen. In diesem Bereich wäre – wie Erfahrungen aus den vergangenen Jahren gezeigt haben – Platz für maximal etwa 50 Säbelschnäblerfamilien gewesen. Da allerdings kurz vor dem Schlupf der Küken der Wasserstand im Nordbecken durch den Sielverband erheblich abgesenkt wurde, standen fast überhaupt keine geeigneten Kükennahrungsflächen zur Verfügung. Fast alle Küken, die das Nordwestufer des Nordbeckens erreicht hatten, mussten weiterwandern. Ein Ausweichen ins Wattenmeer war nur mit Überquerung der Kreisstraße von Schlüttsiel nach Dagebüll möglich. Hier kam es offensichtlich zu erheblichen Verkehrsverlusten (mündliche Mitteilung der FÖJ und BFD des Vereins Jordsand in Schlüttsiel). Die Küken, die die Überquerung von Straße und Deich überlebt hatten, mussten auf der Wattseite eine Steinschüttung überwinden, um dann in Lahnungsfelder ohne jegliches schützendes Vorland zu gelangen. Der direkte Weg zum nächstgelegenen geeigneten Kükenhabitat, dem Osewoldter Vorland, war durch die Lahnungen versperrt. Die geringe Zahl der im Vorland beobachteten Küken zeigt, dass praktisch alle Küken auf dem Weg von der Brutinsel zum Vorland umgekommen sind.

Um nicht auch im dritten Jahr in Folge eine ökologische Falle für Säbelschnäbler im Hauke-Haien-Koog zu etablieren, muss die Situation dringend verbessert werden. Dazu ist es auf jeden Fall notwendig, im Nordbecken des Koogs zur Brutzeit so hohe Wasserstände einzustellen, dass geeignete Kükenhabitate vorhanden sind, und diese Wasserstände nicht mutwillig abzusenken. Im Fahretofter Westerkoog sollten alle Anstrengungen unternommen werden, zu Beginn der Brutzeit (Mitte April) den Wasserstand so niedrig zu fahren, dass genügend Brutinseln vorhanden sind und möglichst viele Säbelschnäbler aus dem für sie risikoreichen Hauke-Haien-Koog herausgelockt werden können.

Die Serie schlechter Bruterfolgsergebnisse von Säbelschnäblern in Schleswig-Holstein und im gesamten Wattenmeer setzte sich also auch 2018 zumindest teilweise fort. In den genauer untersuchten Brutgebieten hatte es einen sehr guten Bruterfolg mit mehr als einem Küken pro Paar letztmals 1998 im Fahretofter Westerkoog und danach noch vereinzelt in den Niederlanden und – in kleineren Kolonien – auf den Nordseeinseln gegeben. Die bereits in den letzten Jahren geäußerte Sorge, dass der derzeitige Bruterfolg der Säbelschnäbler nicht ausreicht, um den Erhalt der Wattenmeerpopulation zu gewährleisten (Thorup & Koffijberg 2016), bleibt trotz des 2017 und 2018 guten Erfolgs im Beltringharder Koog bestehen. Die für das Monitoring ausgewählten Gebiete sind sicherlich ausreichend repräsentativ

für den Säbelschnäblerbestand in Schleswig-Holstein, um diese Aussage treffen zu können. Auch von anderen Orten liegen keine Hinweise auf einen hohen Bruterfolg vor. So wurde in den Jahren 2009 bis 2012 in keinem der 17 Gebiete des trilateralen Bruterfolgsmonitorings im Wattenmeer ein Bruterfolg von mehr als 0,32 Jungvögeln pro Paar erzielt, häufig wurden überhaupt keine Küken flügge (Thorup & Koffijberg 2016).

Der Säbelschnäbler-Brutbestand des gesamten Wattenmeeres ist seit 1999 deutlich gesunken, verursacht vor allem durch die deutlichen Bestandsrückgänge in den Niederlanden und in Niedersachsen. In Schleswig-Holstein, das den größten Wattenmeerbestand der Art beherbergt, wird der Trend von 1991 bis 2011 noch als „stabil“ eingestuft. Allerdings zeigen sich auch hier seit 2008 deutliche Rückgänge (Koffijberg et al. 2015), die sich auch in jüngerer Zeit bestätigt haben (Koffijberg et al. 2017).




Abb. 2. Bruterfolg von Säbelschnäblern in Europa. Die Daten aus dem Beltringharder Koog (BHK), dem Fahretotter Westerkoog (FTK), dem Hauke-Haien-Koog, von der Hamburger Hallig (Hamb. Hallig) und aus dem Kaiser-Wilhelm-Koog-Vorland (KWK) sind zusätzlich eingetragen (Quellen siehe Hötter et al. 2009, 2010).

6. Empfehlungen für das zukünftige Monitoring

Es gab im Ablauf der Untersuchungen 2018 erneut keine technischen Probleme. Somit hat sich die Methode grundsätzlich bewährt und sie sollte in den nächsten Jahren beibehalten werden. Glücklicherweise ist die Kolonie im Kaiser-Wilhelm-Koog 2018 deutlich gewachsen, so dass vorerst nicht nach Ersatz gesucht werden muss.

7. Danksagungen

Wir bedanken uns bei Christian Piening und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Naturschutzgesellschaft „Schutzstation Wattenmeer“ für ihre tatkräftige Hilfe im Feld. Dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz danken wir für die finanzielle Unterstützung des Vorhabens.

8. Literatur

- Bie, S.D. (1979) Some remarks on the behaviour of the Avocet (*Recurvirostra avosetta*) in relation to difficult breeding places. *Ardea*, 67, 68-69.
- Bie, S.D. & Zijlstra, M. (1985) Kluten *Recurvirostra avosetta* en waterpeil in de Oostvaardersplassen: broeden in een veilige omgeving? *Limosa*, 58, 41-48.
- Birdlife International (2015) European Red List of Birds. BirdLife International, Cambridge.
<https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/european-red-list-birds-0>, 7.12.2018
- Cimiotti, D.V. & Hötker, H. (im Druck) Bedeutung Schleswig-Holsteins für globale Brutbestände von Vogelarten. *Corax*.
- Girard, O. & Yésou, P. (1989) Reproduction de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) sur le marais d'olonne: Chronologie, devenir des pontes. *Gibier Faune Sauvage*, 6, 225-243.
- Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M., & Bezzel, E. (1975) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 6. Charadriiformes (1. Teil) Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Goutner, V. (1985) Breeding ecology of the Avocet (*Recurvirostra avosetta* L.) in the Evros delta (Greece). *Bonner Zool. Beitr.*, 36, 37-50.
- Hötker, H. (1998) Intraspecific variation in length of incubation period in Avocets (*Recurvirostra avosetta*). *Ardea*, 86, 33-41.
- Hötker, H., Beverungen, M., Hildebrandt, K.-H., Klinner-Hötker, B., Kühn, M., Rehm, R. & Schmidt-Wiborg, T. (2009) Bruterfolgsmonitoring im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 2009. Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*. Studie im Auftrag des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen.
- Hötker, H., Beverungen, M., Hildebrandt, K.-H., Klinner-Hötker, B., Kühn, M., Rehm, R. & Schmidt-Wiborg, T. (2010) Bruterfolgsmonitoring im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer 2010. Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*. Studie im Auftrag des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen.
- Hötker, H., Hälterlein, B., & Südbeck, P. (2005) Numbers and population development of Avocets breeding in Germany. *Wader Study Group Bulletin*, 107, 75-77.

- Hötker, H. & Kölsch, G. (1993) Die Vogelwelt des Beltringharder Kooges. Ökologische Veränderungen in der eingedeichten Nordstrander Bucht. *Corax*, 15, Sonderheft, 1-145.
- Hötker, H. & Segebade, A. (2000) The effects of predation and weather on the breeding success of Avocets *Recurvirostra avosetta*. *Bird Study*, 47, 91-101.
- Klinner-Hötker, B. & Petersen-Andresen, W. (2018) Ornithologisches Gutachten Nordstrander Bucht/Beltringharder Koog. Jahresbericht 2018. Unveröffentlichtes Gutachten Naturschutzstation ETS und Westküste, Schlüttsiel.
- Koffijberg K., Frikke J., Hälterlein B., Laursen K., Reichert G. & Soldaat L. (2017) Breeding birds. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017. qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/breeding-birds.
- Koffijberg, K., Laursen, K., Hälterlein, B., Reichert, G., Frikke, J. & Soldaat., L. (2015) Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991 - 2013. Wadden Sea Ecosystem No. 35. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany. Wadden Sea Ecosystem No. 35. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven.
- Lengyel, S. (2006) Spatial differences in breeding success in the pied avocet *Recurvirostra avosetta*: effects of habitat on hatching success and chick survival. *Journal of Avian Biology*, 37, 381-395.
- Mabee, T.J. (1997) Using eggshell evidence to determine nest fate of shorebirds. *Wilson Bulletin*, 109, 307-313.
- Mayfield, H. (1961) Nesting success calculated from exposure. *Wilson Bulletin*, 73, 255-261.
- Mayfield, H. (1975) Suggestions for calculating nesting success. *Wilson Bulletin*, 87, 456-466.
- Pol, M.v.d., B.J. Ens, D. Heg, L. Brouwer, J. Krol, M. Maier, K.-M. Exo, K. Oosterbeek, T. Lok, C.M. Eising & K. Koffijberg (2010) Do changes in the frequency, magnitude and timing of extreme climate events threaten the population viability of coastal birds? *Journal of Applied Ecology*, 47, 720-730.
- Südbeck, P. & Hälterlein, B. (2001) Brutbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz". *Seevogel*, 22, 41-48.
- Thorup, O. & Koffijberg, K. (2016) Breeding success in the Wadden Sea 2009-2012. A review. Ecosystem No. 36. Common Wadden Sea Secretariat www.waddensea-secretariat.org, Wilhelmshaven.
- Thyen, S., Becker, P.H., Exo, K.-M., Hälterlein, B., Hötker, H., & Südbeck, P. (1998) Monitoring Breeding Success of Coastal Birds. Final Report of the Pilot Study 1996 - 1997. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven.